



INSTRUCTIONS

DEUX JOURS AVANT LE LASER

- Instiller 1 goutte de Timabak 5mg (ou Timolol 0,50% ou Cosopt)
- Instiller 1 goutte de Dicloabak (Diclofenaco ou Voltaren)

CHAQUE SESSION LASER

- Instiller 1 goutte de Timabak 5mg (ou Timolol 0,50% ou Cosopt) et 1 goutte de Dicloabak (Diclofenaco ou Voltaren) toutes les 2-3 heures jusqu'à la nuit
- Prendre 1 comprimé d' Ibuprofen/Enantyum après manger
- Gardez la tête haute pendant les 5 premières heures
- Reposez-vous et ne faites pas d'exercices physiques, juste marcher
- Protéger de la chaleur et du soleil
- S'il y a une forte douleur, appelez le docteur: +34 696551011

APRES FINIR LES SESSIONS LASER

- Instiller 1 goutte de Timabak 5mg (ou Timolol 0,50% ou Cosopt) + Dicloabak (Diclofenaco ou Voltaren) 3 fois/jour pendant 10 jours
- Instiller 1 goutte de Tropicamida avant d'aller dormir pendant 2 nuits
- Appelez le docteur: +34 696551011

PENDANT 3-4 MOIS

- Instiller Hyloparin 3-4 fois/jour

APRÈS 2 MOIS DU LASER

- Envoyer des photos d'oeil avec App Eye Selfie pour contrôle
- Demander un rendez-vous pour la prochaine phase par email info@eyecos.eu